

# oscillococcinum®

## D O S E

### COMPOSITION

Extrait filtré de foie et de cœur d'*Anas barbariæ* dynamisé à la 200<sup>e</sup> K.  
Excipients (saccharose, lactose) q.s.p. 1 dose globules de 1 g.

### INDICATIONS ET PROPRIÉTÉS

États grippaux.

Oscillococcinum est un médicament homéopathique.

### PRÉSENTATIONS

Dose-globules de 1 g environ.

Boîte de 1 dose, boîte de 6 doses ou boîte de 30 doses.

### MODE D'EMPLOI

Laisser fondre sous la langue le contenu entier du tube-dose.

Pour les nourrissons : laisser fondre dans un peu d'eau  
et donner à la cuiller ou au biberon.

Prendre Oscillococcinum à distance des repas,  
1/4 d'heure avant ou 1 heure après.

**Oscillococcinum sera d'autant plus efficace et rapide d'action  
qu'il sera pris de façon précoce,  
dès les premiers symptômes de l'état grippal.**

### POSOLOGIE USUELLE

La posologie varie selon le moment où l'on intervient :

- **Pendant la période hivernale :**

prendre une dose par semaine.

- **État grippal à son début :**

prendre une dose le plus tôt possible.

Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle.

- **État grippal déclaré :**

prendre une dose matin et soir pendant 1 à 3 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours,  
consulter votre médecin.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,  
contactez-le avant de prendre ce médicament.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - MISES EN GARDE

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :


Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### MODE D'OUVERTURE



1 - Sortir la barquette de 3 doses de l'étui.



2 - Appuyer sur l'alvéole côté transparent pour rompre l'opercule.



3 - Sortir la dose.

Visa 215-1502

BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.